



# Razas atópicas



**ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN PERROS CON PRURITO**

**¿Por qué sospechamos de una "Dermatitis Atópica"?**

La sospecha de dermatitis atópica surge si la historia clínica y la primera exploración coinciden con un mínimo de 3 de las características clínicas principales y de 3 de las características menores:

<p><b>Características clínicas principales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primera aparición de signos a los 6 meses - 3 años.</li> <li>• Prurito, responde al tratamiento con corticosteroides.</li> <li>• Eritema localizado en la cara y oídos.</li> <li>• Pododermatitis.</li> <li>• Queilitis.</li> </ul>	<p><b>Características menores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición racial.</li> <li>• Predisposición familiar.</li> <li>• Dermatitis recidivante crónica.</li> <li>• Dermatitis por lamido.</li> <li>• Lesiones mediales en extremidades posteriores.</li> <li>• Antecedentes de urticaria y angioedema.</li> <li>• Variación estacional.</li> <li>• Los signos pueden variar al cambiar la residencia.</li> </ul>
---	---

**Sospecha clínica de Dermatitis Atópica Canina (D.A.C.)**

