

# Recomendaciones para el uso de Interferón Omega Recombinante Felino (Virbagen® Omega) en el control a largo plazo de la Dermatitis Atópica Canina (D.A.C.)




*Alergias*

# Protocolo y preparación de las inyecciones

Inyecciones subcutáneas usando una jeringa de insulina de 1 ml.

10 inyecciones durante el primer periodo de 6 meses y luego 1 inyección mensual de mantenimiento.



## Dosis

	Pesos	Dosis total por inyección	Volumen/inyección	Parte del vial de 1 ml
Perros pequeños	5 kg a 15 kg	1 MU	0,1 ml	1/10
Perros medianos	15 kg a 25 kg	2 MU	0,2 ml	1/5
Perros grandes	25 kg a 45 kg	3 MU	0,3 ml	1/3
Perros muy grandes	>45 kg	5 MU	0,5 ml	1/2

5-15 kg preparar un frasco de 10 MU de Virbagen® Omega y repartirlo en 10 jeringas de insulina cada una con 0.1 ml de la mezcla y congelarlas, para tratar al perro durante 150 días se necesitan 1 frasco de Virbagen® Omega de 10 MU.

15-25 kg preparar un frasco de 10 MU de Virbagen® Omega y repartirlo en 5 jeringas de insulina cada una con 0.2 ml de la mezcla y congelarlas, para tratar al perro durante 150 días se necesitan 2 frascos de Virbagen® Omega de 10 MU.

25-45 kg preparar un frasco de 10 MU de Virbagen® Omega y repartirlo en 3 jeringas de insulina cada una con 0.33 ml de la mezcla y congelarlas, para tratar al perro durante 150 días se necesitan 3 frascos de Virbagen® Omega de 10 MU.

>45 kg preparar un frasco de 10 MU de Virbagen® Omega y repartirlo en 2 jeringas de insulina cada una con 0.5 ml de la mezcla y congelarlas, para tratar al perro durante 150 días se necesitan 5 frascos de Virbagen® Omega de 10 MU.

## Recomendaciones

Preparar por adelantado como mínimo todas las jeringas de insulina necesarias hasta la próxima visita, cada una con el volumen necesario en función del peso del perro.

Identificar claramente los datos del propietario y del perro en cada jeringa con un marcador.

Decidir si el propietario administrará o no, alguna de las inyecciones. En caso afirmativo, enseñarle inyectando la primera dosis.

Entregar al propietario todas las jeringas cargadas que va a utilizar antes de la próxima visita con instrucciones de mantenerlas congeladas en casa. Guardar el resto de las jeringas en la clínica y congelarlas.

Sacar del congelador y mantener refrigeradas las jeringas que vayan a utilizarse una hora antes de la inyección.

No volver a congelar una jeringa ya descongelada.

## Recomendaciones para las visitas

**D0 (primera visita) = propuesta de tratamiento con Virbagen® Omega**

- Exploración general y dermatológica.
- Valoración de los signos clínicos y el prurito.
- Informar al propietario sobre este nuevo tratamiento de control a largo plazo de la atopia.
- Prescripción y preparación de las inyecciones de Virbagen® Omega.
- Iniciar el tratamiento (primera inyección administrada por el veterinario enseñando al propietario).
- Planificación de las visitas posteriores (elaborar calendario de visitas para el propietario).
- Decidir si se ha de prescribir un tratamiento inicial adicional en función de la gravedad de los signos clínicos y del prurito, así como de la evaluación por parte del veterinario y propietario (7 días de Cortavance®).

**D14 (2 semanas) = altamente recomendada**

- Comprobar el cumplimiento por parte del propietario y la tolerancia al tratamiento.
- Examen general y dermatológico.
- Valoración de los signos clínicos y prurito; evaluación de la eficacia.



**D35 (1 mes) = visita necesaria al cabo de un mes para evaluar la necesidad potencial de un tratamiento antiinflamatorio adicional**

- Comprobar el cumplimiento por parte del propietario y la tolerancia al tratamiento.
- Examen general y dermatológico.
- Valoración de los signos clínicos y prurito; evaluación de la eficacia.
- Decidir si se ha de prescribir un tratamiento inicial adicional en función de la evaluación por parte del veterinario y propietario (7 días de Cortavance®)

**D60 (2 meses) y D120 (4 meses) = altamente recomendada-** Comprobar el cumplimiento por parte del propietario y la tolerancia al tratamiento.

- Examen general y dermatológico.
- Valoración de los signos clínicos y prurito; evaluación de la eficacia.

**D180 (6 meses) = evaluación general necesaria y decisión sobre la administración de inyecciones mensuales de por vida.**

- Comprobar el cumplimiento por parte del propietario y la tolerancia al tratamiento.
- Examen general y dermatológico.
- Valoración de los signos clínicos y prurito; evaluación de la eficacia.
- Decidir si se va a realizar un control de por vida de la atopia con inyecciones mensuales. Aplicar tratamientos adicionales dependiendo del caso y del nivel de respuesta.

**Tabla de tratamiento y visitas de seguimiento**

Visitas y tratamiento	Día 0	Día 3	Día 7	Día 14	Día 21	Día 35	Día 60	Día 90	Día 120	Día 150	Día 180
Semanas			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 5	Semana 8				
Meses						Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Fechas											
Visitas	Visita Inicial			Visita recomendada	Visita Necesaria al mes	Visita recomendada			Visita recomendada		Visita Necesaria al los 6 meses
Inyecciones	Inyección 1 en la clínica	Inyección 2 en casa	Inyección 3 en casa	Inyección 4 en la clínica ó en casa	Inyección 5 en casa	Inyección 6 en casa	Inyección 7 en la clínica ó en casa	Inyección 8 en casa	Inyección 9 en la clínica ó en casa	Inyección 10 en casa	Inyección en la clínica y inyección mensual
5-15 kg	Preparar 10 jeringas x 1 M.U. (10 x 0.1ml) inyectar 0.1 ml y congelar 9 jeringas										
15-25 kg	Preparar 5 jeringas x 2 M.U. (5 x 0.2 ml) inyectar 0.2 ml y congelar 4 jeringas										
25-45 kg	Preparar 3 jeringas x 3.3 M.U. (3 x 0.33 ml) inyectar 0.33 ml y congelar 2 jeringas										
> 45 kg	Preparar 2 jeringas x 5 M.U. (2 x 0,5ml) inyectar 0,5 ml y congelar 1 jeringa										
Tratamientos complementarios recomendados en todos los casos	Para control del prurito y eritema. Bañar con Allermyl® shampoo. Aplicar Cortavance® en las zonas afectadas.										
	Limpieza auricular con Epi-Otic® Advanced como mínimo una vez cada 2 semanas.										
	Dieta con alimento hipoalergénico.										
Tratamientos complementarios en casonecesario	OTITIS: Una aplicación al día de Dexoryl® durante 5 días.										
	FOLICULITIS y/o BOG: Rilexine® 15mg/kg cada 12h (ó 30 mg/kg cada 24h) durante mínimo 4 semanas + Pyoben® o Hexadene® shampoo.										
	DERMATITIS por <i>Malassezia</i> : Pyoben® o Hexadene® shampoo dos veces por semana durante 3 semanas.										
	Tratamiento antiinflamatorio adicional: Cortavance® una vez al día durante 7 días.										



## ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN PERROS CON PRURITO

### ¿Por qué sospechamos de una "Dermatitis Atópica"?

La sospecha de dermatitis atópica surge si la historia clínica y la primera exploración coinciden con un mínimo de 3 de las características clínicas principales y de 3 de las características menores:


#### Características clínicas principales

- Primera aparición de signos a los 6 meses - 3 años.
- Prurito, responde al tratamiento con corticosteroides.
- Eritema localizado en la cara y oídos.
- Pododermatitis.
- Queilitis.

#### Características menores

- Predisposición racial.
- Predisposición familiar.
- Dermatitis recidivante crónica.
- Dermatitis por lamido.
- Lesiones mediales en extremidades posteriores.
- Antecedentes de urticaria y angioedema.
- Variación estacional.
- Los signos pueden variar al cambiar la residencia.

### Sospecha clínica de Dermatitis Atópica Canina (D.A.C.)



Virbac México, S.A. de C.V. Lote 30,  
Manzana 1, Parque Industrial Guadalajara  
El Salto Jalisco, CP 45690.  
Tel. (33) 50 00 25 50; Fax (33) 50 00 25 15  
LÍNEA 01 800 024 75 75  
clientes@virbac.com.mx,  
www.virbac.com.mx

**Virbac**  
SALUD ANIMAL