

# CORTAVANCE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-353

## Uso Veterinario

Solución para atomización cutánea, para su uso en perros.

## Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Hidrocortisona Aceponato..... 0.584 mg

Vehículo c.b.p..... 1 ml

## Descripción:

CORTAVANCE® incorpora Hidrocortisona Aceponato (HCA), un innovador corticosteroide (dermo-corticosteroide) indicado en el tratamiento sintomático de las dermatosis pruríticas e inflamatorias del perro. La HCA es un corticosteroide de la familia de los diésteres, moléculas lipofílicas que aseguran una mejor penetración en la piel asociada a una baja disponibilidad plasmática. La HCA se acumula y se metaboliza en las estructuras dérmicas. La primera transformación es responsable de la elevada potencia antiinflamatoria, incluso a dosis bajas. La segunda, tal como se ha demostrado en los estudios de distribución de radioactividad, de una mínima presencia de cortisol en el flujo sanguíneo. La aplicación tópica de diésteres se traduce, por tanto, en un alto índice terapéutico: potente actividad local con reducidos efectos secundarios sistémicos.

## Indicaciones:

Tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas en perros.

## Vía de administración:

Uso cutáneo.

## Dosis:

CORTAVANCE® se aplica presionando el atomizador a una distancia de unos 10 cm de la zona a tratar. La dosis recomendada es de 1,52 µg de hidrocortisona aceponato/cm<sup>2</sup> de piel afectada al día.

Esta dosis puede obtenerse con dos aplicaciones del atomizador sobre la superficie a tratar equivalente a un cuadrado de 10 cm x 10 cm. Repetir el tratamiento diariamente durante 7 días consecutivos.

La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente, p.e., a un tratamiento de los dos costados, desde el lomo hasta las cadenas mamarias incluidos los hombros y los muslos.

Recomendaciones y forma de uso:

No asperjar en los ojos del animal. Presentado como un spray volátil, este medicamento no requiere masaje.

En el caso de enfermedad microbiana concurrente o de infestación parasitaria, el perro deberá recibir el tratamiento apropiado. El uso en gestantes, lactantes, menores de 7 meses y animales con el síndrome de Cushing debe basarse en la evaluación del riesgo contra el beneficio.

## Sobre dosificación:

A las dosis terapéuticas recomendadas y el doble del tiempo recomendado, no se observaron efectos sistémicos.

## Contraindicaciones:

No usar en úlceras cutáneas.

## Advertencias:

En caso de contacto accidental con la piel, se recomienda lavar con abundante agua. Lavar las manos después del uso. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con agua abundante. En caso de irritación ocular, consultar al médico. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el inserto.

Aplicar preferentemente en un lugar ventilado. El producto puede ser inflamable. No aplicar sobre llama o cualquier material incandescente. No fumar mientras se manipula el producto veterinario. Interacciones: en ausencia de información, se recomienda no aplicar otras preparaciones tópicas al mismo tiempo sobre las mismas lesiones.

## Consulte al médico veterinario

"Su venta requiere receta médica"

Si requiere de información adicional consulte al Departamento Técnico.

Elaborado por:

Virbac S.A. 06511 Carros, Francia.

Importado y distribuido por:

Virbac México, S.A. de C.V.

Lote 30, Manzana 1, Parque Industrial Guadalajara.

El Salto Jalisco, CP 45690.

Tel. (33) 50 00 25 50;

LÍNEA 01 800 024 75 75 clientes@virbac.com.mx

www.virbac.com.mx

El primer dermoesteroide veterinario:

# ACTÚA EN LA PIEL Y SÓLO EN LA PIEL

# CORTAVANCE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-353

## Selección de casos clínicos

3 casos clínicos examinados en México



El primer dermoesteroide veterinario:

# ACTÚA EN LA PIEL Y SÓLO EN LA PIEL



**Virbac**  
SALUD ANIMAL



El primer dermoesteroide veterinario:  
**ACTÚA EN LA PIEL  
Y SÓLO EN LA PIEL**

# CORTAVANCE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-353

## 3 CASOS CLÍNICOS

Examinados en México

### 01 CASO TRATADO CON CORTAVANCE®

#### Historia

Schnauzer, macho, 8 meses de edad con historia de depresión, anorexia y aparición gradual de úlceras en cuello, flancos, región coxofemoral y aspecto medial de muslo.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.

#### Manejo diagnóstico

Citología y biopsia cutánea para análisis histológico.

#### Diagnóstico

Necrolisis epidérmica tóxica.

#### Manejo inicial

Prednisona a dosis de inmunosupresión con reducción gradual, pentoxifilina, tramadol, lavados con solución salina al 0.9% y aplicación tópica de mupirocina.

#### Manejo con Cortavance

Se retira la medicación inicial y se inicia la aplicación tópica de Cortavance cada 24 horas por 3 semanas.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.

### 02 CASO TRATADO CON CORTAVANCE®

#### Historia

Pastor Alemán, macho, 4 años de edad con historia de herida en el aspecto lateral y medial de tarsos y metatarsos del miembro pélvico derecho con falta de cicatrización de 6 meses de evolución.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.

#### Manejo diagnóstico

Citología, cultivo bacteriológico y micológico, estudios radiográficos y biopsia cutánea para evaluación histológica.

#### Diagnóstico

Fístula metatarsiana del Pastor Alemán.

#### Manejo Inicial

Prednisona a dosis de inmunosupresión con reducción gradual, ciprofloxacino, lavados con solución salina al 0.9% y clorhexidina.

#### Manejo con Cortavance

Se retira medicación inicial y se inicia la aplicación tópica de Cortavance cada 24 horas por 3 semanas.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.

### 03 CASO TRATADO CON CORTAVANCE®

#### Historia

Mestizo, macho, 3.6 años de edad con historia de costras y úlceras en pabellones auriculares de 3 meses de evolución.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.

#### Manejo diagnóstico

Citología y biopsia cutánea para análisis histológico.

**Diagnóstico:** Pénfigo foliáceo.

#### Manejo inicial

Prednisona a dosis de inmunosupresión con reducción gradual.

#### Manejo con Cortavance

Se retira medicación inicial y se inicia con la aplicación tópica de Cortavance cada 24 horas por 3 semanas.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.



Fotografía cortesía M.V.Z. M.S.C Luis R. Nolasco E.