

TRATAMIENTO PARA LA MASTITIS

Contagiosa



Leche

Cortada o con grumos, con sangre, o leche amarillenta con sangre.

Ubre

Cuarto enfermo está rojo, caliente, duro y adolorido

Vaca

Estado general aparentemente normal, pero no se deja ordeñar.

Ambiental



Leche

Es delgada, espumosa, escasa o sólo hay suero amarillento o rojizo.

Ubre

Dura como piedra, caliente, roja y muy adolorida.

Vaca

Mal estado en general, con fiebre, deprimida y sin apetito.

Tratamiento

Ordeñar a fondo él o los cuartos enfermos.

Aplicar una jeringa de **RILEXINE 200®** en cada cuarto enfermo por tres ordeños seguidos.

Aplicar 25 a 35 ml de **RILEXINE 150®** por vía I.M. cada 24 horas 3 aplicaciones.

Aplicar 30 ml de **ARTHRIDINE®** vía I.M. y repetir 20 ml al día siguiente.

Tratamiento

Ordeñar a fondo él o los cuartos enfermos cada 12 horas.

Aplicar una jeringa de **RILEXINE 200 NP®** en cada cuarto enfermo después del ordeño durante 2-3 días.

Aplicar 30-40 ml de **VETERRALENT®** vía I.M. profunda o I.V. lenta (dosis única) o repetir a las 72 horas.

Aplicar 15-20 ml de **MEGLUDYNE®** cada 24 horas durante 3 días.

VETERRALENT 20% L.A.®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 056

MEGLUDYNE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 264

ARTHRIDINE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 101

RILEXINE 150®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 271

RILEXINE 200 NP®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 316

RILEXINE 200®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042 - 106



Tus aliados en el tratamiento y control de la mastitis.

LÍNEA VIRBAC 01 800 024 7575

www.virbac.com.mx

Apasionados por la salud animal

Virbac
SALUD ANIMAL